



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 w Bytomiu
ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
Tel.: (32) 39 63 200 Fax.: (32) 39 63 251
NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907
Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619
e-mail: info@szpital1.bytom.pl www.szpital1.bytom.pl
ePUAP: /SZPITAL1BYTOM/skrytkaESP



Leczenie bólu metodą nadtwardówkową [okołooponową]

Co to jest?

Leki są podawane poprzez [cewnik] nadtwardówkowy – miękką rurkę (nazywaną cewnikiem), która wprowadzona jest do Pana/Pani pleców.

Znieczulenie nadtwardówkowe wpływa wyłącznie na ściśle określone regiony Pana/Pani ciała. Znieczulenie nadtwardówkowe może zostać wykorzystane podczas zabiegu chirurgicznego i może być kontynuowane w okresie pooperacyjnym bez konieczności wykonywania dodatkowych nakłuć. Udowodniono, iż znieczulenie nadtwardówkowe umożliwia uzyskanie skutecznej kontroli bólu po operacji. Znieczulenie nadtwardówkowe może zmniejszyć częstość występowania powikłań pooperacyjnych i może umożliwić szybszy powrót do zdrowia.

Jak to działa?

Anestezjolog wprowadza mały cewnik w Pana/Pani plecy. Może być Pan/Pani zmuszona do przyjęcia pozycji siedzącej i lekkiego pochylenia się tak, by igła mogła zostać odpowiednio wprowadzona. By zapobiec bólowi związanemu z wkłuciem stosuje się znieczulenie miejscowe. Po wprowadzeniu cewnika na miejsce, podaje się przez cewnik lek przeciwbólowy, bezpośrednio. Efekt powinien Pan/Pani czuć już po kilku minutach. Dawkę leku można dopasować tak, by Pan/Pani otrzymywał/a właściwą dawkę dla odczuwanego bólu.

PROSIMY

PAMIĘTAĆ

Jeśli czuje Pan/Pani ból pomimo podawanego leku należy zgłosić to personelowi medycznemu. Dopasują oni dawkę lub podadzą dodatkowe leki przeciwbólowe.